

Na co zwrócić uwagę zaraz po zacementowaniu korony lub mostu?

Właśnie zacementowano Ci na zębach korony lub mosty. Uzupełnią one bardzo dobrze brakujące zęby i powinny spełniać swoją funkcję przez lata, pod warunkiem, że będziesz przestrzegał następujących zaleceń:

1. Nie żuj twardych pokarmów przez 24 godziny od momentu zacementowania uzupełnienia, cement mocujący musi związać.

2. W celu zapewnienia optymalnej trwałości Twoim koronom i mostom oraz zapobiegania próchnicy zębów filarowych proszę przeprowadzać w domu następujące zabiegi profilaktyczne:

- szczotkować i nitkować zęby oraz uzupełnienia protetyczne po jedzeniu oraz przed snem;
- stosować płukankę z fluorem, płukać energicznie przez przynajmniej 2 minuty każdego dnia;
- stosować zalecony żel z fluorem;
- stosować irygator, według naszych porad.

UWAGA: najczęstszą przyczyną usterek protez jest niewystarczająco częste pojawianie się na przeglądach. Proszę nas odwiedzać rutynowo **w odstępach 6 miesięcy**.

Często problemy mogą zostać zauważone na wczesnym etapie i łatwo skorygowane. Oczekiwanie przez dłuższy czas może skomplikować leczenie, a nawet prowadzić do konieczności ponownego wykonania całego uzupełnienia.

Proszę niezwłocznie umówić się na wizytę kontrolną, jeśli zaistnieje

którakolwiek z poniższych okoliczności:

- uczucie ruchomości albo obluzowania się uzupełnienia
- nadwrażliwość na słodkie
- dziwny posmak w okolicy uzupełnienia
- nadwrażliwość na nacisk
- odłamanie się części masy z uzupełnienia
- zaczerwienienie, obrzęk dziąseł
- krwawienie dziąseł podczas mycia zębów